

# Palgus<sup>®</sup>

Jemvelva<sup>®</sup> active

## INSECTICIDA

### FICHA TÉCNICA

Palgus<sup>®</sup> con Jemvelva<sup>®</sup> active es un insecticida que ofrece un excelente control en Trips, Lepidópteros y Minadores, ayudando a los productores a mantener la sanidad de sus cultivos. Por su perfil toxicológico está clasificado como categoría 5, banda verde\*, lo que disminuye el riesgo de intoxicación al aplicador y brinda un corto periodo de re-entrada. Palgus<sup>®</sup> es su aliado en el manejo integrado de plagas.\*\*

\*De acuerdo a la NOM-232-SSA1-2009

\*\*Si se utiliza según las instrucciones de la etiqueta.



Cultivemos un futuro brillante.

## INSECTICIDA

Sin plagas produces PAL´ GUSTO de todos.

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo: Jemvelva<sup>®</sup> active  
 Familia Química: Spinosines  
 Presentaciones: 100mL y 1L  
 Categoría Toxicológica: 5 (Banda Verde)  
 Registro Sanitario: RSCO-INAC-0103X-301-064-006

### COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Ingrediente Activo: Jemvelva<sup>®</sup> active: Equivalente a 60 g de i.a./L.  
 Ingredientes Inertes: Antiespumante, dispersante, humectante, anticongelante, biocida, espesante y vehículo

### MODO DE ACCIÓN:

Palgus<sup>®</sup> actúa sobre las larvas por ingestión y contacto, incrementando así su poder de control.

Palgus<sup>®</sup> penetra sobre las hojas dando así un excelente nivel de control y un prolongado período de protección.

## RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES	LMR [ppm]* Spinetoram
Maíz (1 día grano) (3 días forraje)	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	100	Dirijase la aspersion a las hojas y al cogollo cuando se observe de un 30-40% de plantas con daño y/o larvas vivas. Aplíquese preferentemente sobre estados iniciales de la plaga.	0.04 (grano) 3.50 (forraje)

Periodo de reentrada a las áreas tratadas: 4 horas. ( ) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. (SL) Sin límite.

\* La fuente de referencia del Límite Máximo de Residuos (LMR) corresponde a lo autorizado por COFEPRIS/ EUA-EPA. Debido a que los valores de LMRs pudieran cambiar con el tiempo, se recomienda al usuario consultar las fuentes de referencia oficiales y para el caso de exportación queda bajo su responsabilidad el cumplimiento con los LMRs de los países destino. \*\*Fuente de referencia de LMR: COFEPRIS/ Unión Europea.

"Este producto es tóxico para abejas expuestas al tratamiento dentro de las tres horas siguientes a la aplicación. No aplique el producto cuando se esté planeando hacer liberaciones de abejas para la polinización del cultivo. Es necesario esperar al menos tres horas después de la aplicación del producto para iniciar con el programa de liberación de abejas. Una vez que el follaje se encuentre seco después de la aplicación del producto, el riesgo de toxicidad sobre abejas disminuye considerablemente."

### CONTRAINDICACIONES:

No se aplique en cultivos para los que no tiene recomendación de uso, no aplicar cuando existe posibilidad de lluvia que pueda provocar el lavado del producto. No permita que la aspersion sea desviada a cultivos vecinos, evitando aplicar cuando exista velocidad del viento mayor a 10 km/ hora o con temperaturas elevadas. Evite aplicar bajo condiciones de sequía extrema o en cultivos estresados por sequía.

### INCOMPATIBILIDAD:

No se recomienda mezclar Palgus<sup>®</sup> en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados, sin embargo es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

### FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

### MANEJO DE RESISTENCIA:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.



Registro Sanitario: RSCO-INAC-0103X-301-064-006

Banda Precautoria: Verde

Categoría toxicológica: 5

Titular del registro: CORTEVA MX, S.A. DE C.V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.

Fecha de actualización: Septiembre 2023