

Palgus® Jemvelva® active

INSECTICIDA



RED DE CUSTODIA

PROTEGIENDO NUESTRO FUTURO

Conozca más de nuestro programa en: www.reddecustodia.com



Registro Sanitario: RSCO-INAC-0103X-301-064-006

Banda Precautoria: Verde

Categoría toxicológica: 5

Titular del registro: CORTEVA MX, S. A. DE C.V.

Para cuidar su salud y garantizar la efectividad del producto lea y entienda las instrucciones de la etiqueta antes de usar el producto.

Este producto puede ser nocivo, si no se usa de acuerdo a las recomendaciones establecidas en la etiqueta.



Cultivemos un futuro brillante.

Palgus®

Jemvelva® active

INSECTICIDA

Sin plagas produces PAL'GUSTO de todos.

Palgus® con Jemvelva® active es un insecticida de origen natural que ofrece el mejor control en trips, lepidópteros y minadores, ayudando a los productores a mantener la sanidad de sus cultivos.

Por su perfil toxicológico está clasificado como categoría 5, banda verde*, lo que disminuye el riesgo de intoxicación al aplicador y brinda un corto periodo de reentrada.

Por su modo y doble mecanismo de acción Palgus® protege desde los primeros minutos a horas después de aplicado.

*De acuerdo a la NOM-232-SSA1-2009.

BENEFICIOS

Palgus® es un miembro de la clase de los spinosines desarrollado por Corteva Agriscience como una herramienta de manejo para el control de insectos que comparten la misma estructura básica química, los cuales son derivados de la fermentación de la bacteria *Saccharopolyspora spinosa*. Posterior a la fermentación, los activos se modifican químicamente para crear un único ingrediente activo llamado **Spinetoram**.



Palgus® tiene movimiento translaminar, lo que brinda un excelente control residual.



Doble modo de acción.



Requiere bajas dosis por hectárea.



Corto intervalo de cosecha.



Rápido efecto de control.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (mL/ha)	RECOMENDACIONES
Maíz (1 día grano) (3 días forraje)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	100	Dirijase la aspersión a las hojas y al cogollo cuando se observe de un 30-40% de plantas con daño y/o larvas vivas. Aplíquese preferentemente sobre estados iniciales de la plaga.

Periodo de reentrada a las áreas tratadas: 4 horas. (IS) Intervalo de seguridad: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin Límite

"Este producto es tóxico para abejas expuestas al tratamiento dentro de las tres horas siguientes a la aplicación. No aplique el producto cuando se esté planeando hacer liberaciones de abejas para la polinización del cultivo. Es necesario esperar al menos tres horas después de la aplicación del producto para iniciar con el programa de liberación de abejas. Una vez que el follaje se encuentre seco después de la aplicación del producto, el riesgo de toxicidad sobre abejas disminuye considerablemente."